



## รายงานผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การผลิตกล้วยไม้เอื้องแซะหอมโดยวิธีการจัดการศัตรูพืชเชิงพาณิชย์ :  
การประเมินความเสียหายเนื่องจากโรคของกล้วยไม้เอื้องแซะหอม

Commercial Production of *Dendrobium scabrilingue* Lindl.  
by Integrated Pest Management : Assessment of Disease Incidence  
and Loss of Aung Sae Orchid

โครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ : การผลิตเอื้องแซะหอมเชิงพาณิชย์เพื่อ  
อุตสาหกรรมเครื่องหอม

โดย

ประพันธ์ โอสถาพันธุ์



## รายงานผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

**เรื่อง** การผลิตกล้วยไม้เอื้องแซะหอมโดยวิธีการจัดการศัตรูพืชเชิงพาณิश्य์ : การประเมิน  
ความเสียหายเนื่องจากโรคของกล้วยไม้เอื้องแซะหอม

Commercial Production of *Dendrobium scabrilingue* Lindl. by Integrated Pest  
Management : Assessment of Disease Incidence and Loss of Aung Sae Orchid

**โครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ** การผลิตเอื้องแซะหอมเชิงพาณิश्य์เพื่ออุตสาหกรรม  
เครื่องหอม

**ได้รับการจัดสรรงบประมาณวิจัย** ประจำปี 2550  
จำนวน 295,500 บาท

**หัวหน้าโครงการ** ผศ.ดร. ประพันธ์ โอสธำพันธุ์

งานวิจัยเสร็จสิ้นสมบูรณ์

30 กันยายน 2551



## กิตติกรรมประกาศ

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ได้  
จัดสรรงบประมาณในการทำการวิจัยจากหมวดเงินอุดหนุน งบประมาณแผ่นดินปี พ.ศ. 2550  
จนกระทั่งงานวิจัยเรื่องนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี นอกจากนี้ขอขอบพระคุณ คุณบัณฑิต ต๊ะเสาร์ และผู้ที่มี  
ส่วนช่วยเหลือที่ไม่ได้กล่าวนามไว้ในที่นี้ด้วย

คณะผู้วิจัย



## สารบัญเรื่อง

| เรื่อง            | หน้า |
|-------------------|------|
| สารบัญตาราง       | ก    |
| สารบัญภาพ         | ข    |
| สารบัญภาคผนวก     | ค    |
| บทคัดย่อ          | 1    |
| Abstract          | 2    |
| คำนำ              | 3    |
| วัตถุประสงค์      | 5    |
| อุปกรณ์           | 6    |
| วิธีการทดลอง      | 7    |
| ผลการทดลอง        | 9    |
| วิจารณ์ผลการทดลอง | 22   |
| สรุปผลการทดลอง    | 23   |
| เอกสารอ้างอิง     | 24   |
| ภาคผนวก           | 25   |

## สารบัญตาราง

| ตารางที่ |                                                                                                                            | หน้า |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1        | ชื่อและจำนวนเชื้อราที่สามารถแยกและจำแนกชื่อได้จากชิ้นส่วนของต้น<br>เอื้องแซะที่เป็นโรค                                     | 9    |
| 2        | เปอร์เซ็นต์การเกิดโรคหลังจากปลูกเชื้อรา <i>Alternaria</i> sp. ไอโซเลตต่าง ๆ<br>ที่ 7 วัน                                   | 14   |
| 3        | เปอร์เซ็นต์การเกิดโรคหลังจากปลูกเชื้อรา <i>Alternaria</i> sp. ไอโซเลตต่าง ๆ<br>ที่ 14 วัน                                  | 15   |
| 4        | การแยกเชื้อกลับจากใบเอื้องแซะที่ปลูกเชื้อราจากกรรมวิธีการทดลองที่<br>10 คือ ปลูกเชื้อรา <i>Alternaria</i> sp. ไอโซเลตที่ 1 | 16   |
| 5        | การแยกเชื้อกลับจากใบเอื้องแซะที่ปลูกเชื้อราจากกรรมวิธีการทดลองที่<br>11 คือ ปลูกเชื้อรา <i>Alternaria</i> sp. ไอโซเลตที่ 2 | 16   |
| 6        | การแยกเชื้อกลับจากใบเอื้องแซะที่ปลูกเชื้อราจากกรรมวิธีการทดลองที่<br>12 คือ ปลูกเชื้อรา <i>Alternaria</i> sp. ไอโซเลตที่ 3 | 17   |
| 7        | กรรมวิธีการทดลองที่ 13 ปลูกเชื้อรา <i>Alternaria</i> sp. ไอโซเลตที่ 4                                                      | 17   |

## สารบัญภาพ

| ภาพที่ |                                                                                          | หน้า |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1      | ลักษณะของเชื้อรา <i>Colletotrichum</i> sp.                                               | 9    |
| 2      | ลักษณะของเชื้อรา <i>Alternaria</i> sp.                                                   | 10   |
| 3      | ลักษณะของเชื้อรา <i>Fusarium</i> sp.                                                     | 10   |
| 4      | ลักษณะของเชื้อรา <i>Pestalotiopsis</i> sp.                                               | 11   |
| 5      | ลักษณะของเชื้อรา <i>Exserohilum</i> sp.                                                  | 11   |
| 6      | ลักษณะของเชื้อรา <i>Curvularia</i> sp.                                                   | 12   |
| 7      | ลักษณะของเชื้อรา <i>Nigrospora</i> sp.                                                   | 12   |
| 8      | ลักษณะเส้นใยของเชื้อรา <i>Colletotrichum</i> sp. บนอาหารเลี้ยงเชื้อ<br>ไอโซเลทต่าง ๆ กัน | 18   |
| 9      | ลักษณะเส้นใยของเชื้อรา <i>Fusarium</i> sp. บนอาหารเลี้ยงเชื้อไอโซเลท<br>ต่าง ๆ กัน       | 19   |
| 10     | ลักษณะเส้นใยของเชื้อรา <i>Alternaria</i> sp. บนอาหารเลี้ยงเชื้อไอโซเลท<br>ต่าง ๆ กัน     | 20   |
| 11     | เปอร์เซ็นต์ดัชนีการทำลายหลังจากการปลูกเชื้อรา <i>Alternaria</i> sp.<br>ไอโซเลทที่ 3      | 21   |
| 12     | ความรุนแรงของเชื้อรา <i>Alternaria</i> sp. ไอโซเลทที่ 3 ที่มีผลต่อต้น<br>เอื้องแซะหอม    | 22   |

## ตารางภาคผนวก

| ตารางภาคผนวกที่ |                                                                                                         | หน้า |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1               | ผลการวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์การเกิดโรคหลังจากปลูกเชื้อรา<br><i>Alternaria</i> sp. ไอโซเลตต่าง ๆ ที่ 7 วัน  | 26   |
| 2               | ผลการวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์การเกิดโรคหลังจากปลูกเชื้อรา<br><i>Alternaria</i> sp. ไอโซเลตต่าง ๆ ที่ 14 วัน | 26   |



การผลิตกล้วยไม้เอื้องชะห้อมโดยวิธีการจัดการศัตรูพืชเชิงพาณิชย์ :  
การประเมินความเสียหายเนื่องจากโรคของกล้วยไม้เอื้องชะห้อม

ประพันธ์ โอสถาปนีย์

ภาควิชาอารักขาพืช

คณะผลิตกรรมการเกษตร

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

บทคัดย่อ

จากการศึกษาการแยกและการจำแนกเชื้อราสาเหตุโรคของกล้วยไม้เอื้องชะห้อม พบว่าสามารถแยกเชื้อราได้ทั้งหมด 42 ไอโซเลต และจำแนกออกเป็น 7 สกุล และเมื่อนำเชื้อราที่แยกได้มาทดสอบความสามารถในการก่อโรคกับต้นเอื้องชะห้อมซึ่งได้แก่ เชื้อรา *Colletotrichum* sp., *Fusarium* sp. และเชื้อรา *Alternaria* sp. รวมทั้งหมด 13 ไอโซเลต พบว่า เชื้อรา *Alternaria* sp. ไอโซเลตที่ 3 มีความสามารถในการก่อความรุนแรงของโรคได้สูงที่สุดเท่ากับ 90.00 เปอร์เซ็นต์ที่ 14 วัน ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีการทดลองเปรียบเทียบที่ไม่ได้ปลูกเชื้อ

จากการศึกษาการประเมินความเสียหายเนื่องจากโรคพืช พบว่า เปอร์เซ็นต์การทำลายของเชื้อรา *Alternaria* sp. ไอโซเลตที่ 3 จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ หลังการปลูกเชื้อรา และหลังจากการปลูกเชื้อ 7 วัน จะมีเปอร์เซ็นต์การทำลายเท่ากับ 66.11

Commercial Production of *Dendrobium scarbrilingue* Lindl. by Integrated Pest Management.: Assessment of Disease Incidence and Loss of  
Aung Sae Orchid

PRAPHANT OSATHAPHANT

Department of Plant Protection  
Faculty of Agricultural Production  
Maejo University  
Sansai, Chiang Mai  
Thailand.

---

Abstract

Study on the Isolation and Identification of fungi causing diseases of *Dendrobium scarbrilingue* Lindl. was conducted. Forty two fungi were isolated and these were classified into seven genera. When pathogenicity test of thirteen isolates of *Colletotrichum* sp., *Fusarium* sp. and *Alternaria* sp. on the orchid plants was done, the result showed that *Alternaria* sp. isolate 3 was able to cause highest disease severity of 90 percent at 14 days which were highly significantly different when compared with uninoculated treatment.

*Alternaria* sp. isolate 3 was then subjected to assessment of disease incidence and loss. The result revealed that the percentage of infestation increased continuously after inoculation, the percentage of infestation was 66.11 at 7 days after inoculation.

## คำนำ

ประเทศไทยมีการสำรวจพบกล้วยไม้รวมทั้งสิ้นแล้ว 174 สกุล จำแนกเป็นชนิดแล้วทั้งหมดกว่า 1,154 ชนิด (สلیل และนฤมล, 2545) เอื้องชะหลวงหรือเอื้องชะหอม พบครั้งแรกในประเทศไทย พม่า (สلیل, 2550) อยู่ในสกุลหวายมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า *Dendrobium scabrilingue* Lindl. (Seidenfaden, 1985) ลักษณะดอกสีขาว ฤดูออกดอกเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ ช่วงออกดอกมีทั้งที่ทั้งใบและที่ไม่ทั้งใบมีกลิ่นหอมแรงเพื่อล่อแมลงผสมเกสร (สلیل, 2550) สำหรับดอกเอื้องชะสามารถนำมาสกัดกลิ่นหอมเพื่อนำสารหอมที่ได้ไปปรับสูตรผลิตน้ำหอมแต่ต้องใช้ปริมาณของดอกเอื้องชะจำนวนมาก (นันทฤทธิ์, 2544)

การประเมินความเสียหายของพืชที่เป็นโรค (assessment of disease incidence and loss) โดยหลักการแล้วเป็นการตัดสินความเสียหายของพื้นที่หรือบริเวณของใบพืชที่เป็นโรค ซึ่งวัดความเสียหายออกเป็นระดับต่าง ๆ กัน แต่จากหลักการดังกล่าวนี้อาจจะมองไม่เห็นความชัดเจน จึงจำเป็นที่จะต้องประเมินออกมาในรูปผลผลิตเปรียบเทียบระหว่างพืชปกติกับพืชที่เป็นโรค แล้วคิดค่าเสียหายออกมาเป็นมูลค่า

ในปี ค.ศ. 1950 Chester ได้ทำการประเมินความเสียหายของพืชเป็นครั้งแรก ต่อมาในปี ค.ศ. 1967 Large ก็ได้เสนอผลการประเมินความเสียหายอีก และในปี ค.ศ. 1971 FAO ก็ได้รายงานการประเมินความเสียหายของพืชที่เป็นโรคเป็นครั้งแรก จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1974 James ได้ทำการประเมินความเสียหายของพืชที่เป็นโรคโดยการสุ่มแล้วหาค่าเฉลี่ย

ชวาลา (2529) กล่าวว่า เหตุที่ต้องทำการประเมินความเสียหายของพืชมีดังนี้

1. เพื่อหลีกเลี่ยงการควบคุมโรคที่ไม่เหมาะสม
2. เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้ปลูก
3. เพื่อเป็นการเร่งเร้าให้นักวิจัยหาวิธีการที่เหมาะสมมาใช้
4. ทำให้โรงงานอุตสาหกรรมหันมาผลิตสารเคมีให้เพียงพอ
5. เพื่อให้รัฐหันมาสนับสนุนงานด้านนี้มากขึ้น

Cramer เป็นนักวิชาการโรคพืชคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่มองเห็นความสำคัญของการประเมินความเสียหายที่เกิดจากโรคพืชและเป็นผู้ที่ริเริ่มการสำรวจความเสียหายที่เกิดจากโรคและศัตรูพืช จนเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปสรุปว่า ความเสียหายที่เกิดจากศัตรูพืชทุกชนิดรวมทั้งโรคพืชมีมากในเขตร้อนศูนย์สูตรของโลกหรือเขตร้อนมากกว่าในเขตหนาว และมีมากในประเทศที่ด้อยพัฒนาหรือ



ประเทศที่กำลังพัฒนา เนื่องจากความรู้ทางวิชาการเกษตรสมัยใหม่และการป้องกันกำจัดยังมีน้อย ประกอบกับสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตของศัตรูพืชทุกชนิด (สืปศักดิ์, 2540)

โดยปกติกล้วยไม้จะมีโรคและศัตรูอยู่จำนวนมาก โรคที่เป็นปัญหาและพบอยู่เสมอมีอยู่หลายโรค ส่วนมากมีสาเหตุเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และเชื้อไวรัส โรคเหล่านี้ ได้แก่ โรคเน่าและเน่าเข้าไส้ แอนแทรคโนส ใบแห้ง ใบจุดดำ ดอกจุดสีสนิม ดอกแห้ง รากเหี่ยวตาย รากเน่า รากขาว และโรคไวรัส เป็นต้น (อนงค์, 2520 ; กุลฉวี, 2526) การทำการเกษตรของเกษตรกรมักเน้นหนักเรื่องสาเหตุของโรคและการควบคุมหรือการป้องกันกำจัดเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากเป็นที่แน่นอนว่า เมื่อเกิดโรคพืชเมื่อใดพืชย่อมต้องได้รับความเสียหายมากบ้างน้อยบ้าง แต่สิ่งที่สำคัญที่ทุกคนมองข้ามไปคือ ปริมาณของความเสียหายที่เกิดจากการทำลายของเชื้อโรคที่แท้จริง เพราะโดยทั่วไปความเสียหายมิได้พูดถึง หรือไม่สามารถบอกได้ว่าเสียหายมากน้อยเพียงใดในรูปของตัวเลขมากกว่าที่จะบอกว่าเสียหายมาก เสียหายปานกลางหรือเสียหายเพียงเล็กน้อยและที่สำคัญเสียหายจริงหรือเปล่า เสียหายเท่าใด คู่กับค่าใช้จ่ายที่จะต้องควบคุมหรือไม่ (สืปศักดิ์, 2540) เอื้องแซะก็เช่นเดียวกับกล้วยไม้ชนิดอื่น ๆ ที่ต้องประสบกับปัญหาเรื่องศัตรูพืชอยู่ด้วย ดังนั้นการศึกษาเรื่องการประเมินความเสียหายเนื่องจากโรคพืชก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ในการพิจารณาเพื่อตัดสินใจในการหาวิธีการควบคุมที่เหมาะสมกับการลงทุนเชิงพาณิชย์

## วัตถุประสงค์

เพื่อประเมินความเสียหาย เนื่องจากโรคของกล้วยไม้เอื้องแซะหอม



## อุปกรณ์

### อุปกรณ์

1. ต้นเอื้องแซะหอม
2. เชื้อราที่ต้องการทดสอบความสามารถในการก่อโรคต่อต้นเอื้องแซะหอม
3. อาหารเลี้ยงเชื้อรา
4. จานเลี้ยงเชื้อ
5. cork borer
6. เข็มเย็บ
7. ถุงพลาสติก
8. กระบอกฉีดยาแบบอัดลม



## วิธีการทดลอง

### 1. การศึกษาการแยกและการจำแนกเชื้อราสาเหตุโรคพืชที่สำคัญของกล้วยไม้เอื้องแซะหอม

เก็บตัวอย่างโรคที่สำคัญของกล้วยไม้เช่น โรคเน่าเข้าไส้ โรคเน่าและ โรคเน่าแห้ง ฯลฯ มาแยกเชื้อให้บริสุทธิ์ โดยแช่ในคลอโรกซ์ 10 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 3 นาที ล้างด้วยน้ำกลั่นหนึ่งฆ่าเชื้อ 3 ครั้ง ๆ 2 นาที ชับด้วยกระดาษทิชชูหนึ่งฆ่าเชื้อ วางชิ้นส่วนของพืชบนอาหารเลี้ยงเชื้อพี.ดี.เอ. (potato dextrose agar) เมื่อเชื้อราเจริญออกจากเนื้อเยื่อพืช ทำการแยกเชื้อให้บริสุทธิ์เพื่อทำการจำแนกเชื้อต่อไป

### 2. การศึกษาการทดสอบความสามารถในการก่อโรคของเชื้อราสาเหตุโรคของกล้วยไม้เอื้องแซะหอม (Pathogenicity test)

นำเชื้อรา *Colletotrichum* sp., *Fusarium* sp. และ *Alternaria* sp. ที่สามารถแยกได้จากตัวอย่างพืชในข้อที่ 1 เลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อเป็นเวลา 14 วัน จากนั้นฉีดพ่นสารแขวนลอยสปอร์ (spore suspension) ของเชื้อราชนิดต่าง ๆ ลงบนใบของต้นเอื้องแซะหอม (หรือบริเวณโคนต้น) ที่ทำให้เกิดแผลก่อนการปลูกเชื้อราและไม่ทำแผลและปลูกเชื้อรา ควบคุมด้วยถุงพลาสติก จากนั้นตรวจดูความสามารถในการทำให้เกิดโรคทุกวัน โดยวางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) มี 14 กรรมวิธี กรรมวิธีละ 4 ซ้ำ ๆ ละ 5 ต้น ดังนี้

- กรรมวิธีการทดลองที่ 1 คือปลูกเชื้อรา *Colletotrichum* sp. ไอโซเลทที่ 1
- กรรมวิธีการทดลองที่ 2 คือปลูกเชื้อรา *Colletotrichum* sp. ไอโซเลทที่ 2
- กรรมวิธีการทดลองที่ 3 คือปลูกเชื้อรา *Colletotrichum* sp. ไอโซเลทที่ 3
- กรรมวิธีการทดลองที่ 4 คือปลูกเชื้อรา *Colletotrichum* sp. ไอโซเลทที่ 4
- กรรมวิธีการทดลองที่ 5 คือปลูกเชื้อรา *Fusarium* sp. ไอโซเลทที่ 1
- กรรมวิธีการทดลองที่ 6 คือปลูกเชื้อรา *Fusarium* sp. ไอโซเลทที่ 2
- กรรมวิธีการทดลองที่ 7 คือปลูกเชื้อรา *Fusarium* sp. ไอโซเลทที่ 3
- กรรมวิธีการทดลองที่ 8 คือปลูกเชื้อรา *Fusarium* sp. ไอโซเลทที่ 4
- กรรมวิธีการทดลองที่ 9 คือปลูกเชื้อรา *Fusarium* sp. ไอโซเลทที่ 5
- กรรมวิธีการทดลองที่ 10 คือปลูกเชื้อรา *Alternaria* sp. ไอโซเลทที่ 1
- กรรมวิธีการทดลองที่ 11 คือปลูกเชื้อรา *Alternaria* sp. ไอโซเลทที่ 2
- กรรมวิธีการทดลองที่ 12 คือปลูกเชื้อรา *Alternaria* sp. ไอโซเลทที่ 3
- กรรมวิธีการทดลองที่ 13 คือปลูกเชื้อรา *Alternaria* sp. ไอโซเลทที่ 4
- กรรมวิธีการทดลองที่ 14 คือฉีดพ่นน้ำกลั่นหนึ่งฆ่าเชื้อ (กรรมวิธีควบคุม)

**บันทึกข้อมูล** - เปอร์เซ็นต์ของการเกิดโรคโดยมีการให้คะแนนดังนี้คือ

0 = เชื้อราไม่เข้าทำลายพื้นที่ใบ

1 = เชื้อราเข้าทำลายพื้นที่ใบ (ลำต้น) 1-25 เปอร์เซ็นต์

2 = เชื้อราเข้าทำลายพื้นที่ใบ (ลำต้น) 26-50 เปอร์เซ็นต์

3 = เชื้อราเข้าทำลายพื้นที่ใบ (ลำต้น) 51-75 เปอร์เซ็นต์

4 = เชื้อราเข้าทำลายพื้นที่ใบ (ลำต้น) 76-100 เปอร์เซ็นต์

### 3. การศึกษาการประเมินความเสียหายเนื่องจากโรคของกล้วยไม้เอื้องชะห่อม

ทำการปลูกเชื้อเทียม (artificial inoculation) โดยนำเชื้อราที่มีความรุนแรงที่สุดในข้อที่ 2 ของเชื้อรา *Colletotrichum* sp, *Fusarium* sp. และ *Alternaria* sp. เลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อเป็นเวลา 14 วัน จากนั้นฉีดพ่นสารแขวนลอยสปอร์ของเชื้อราชนิดต่าง ๆ ลงบนใบของต้นเอื้องชะห่อม (หรือบริเวณโคนต้น) ที่ทำให้เกิดแผลก่อนการปลูกเชื้อ คลุมด้วยถุงพลาสติกเพื่อเป็นการบ่มเชื้อ จากนั้นตรวจดูความสามารถในการทำให้เกิดโรคทุกวัน ทำการประเมินความเสียหายของเอื้องชะห่อม เนื่องจากการเข้าทำลายของโรค โดยนำมาหาค่าเปอร์เซ็นต์การทำลายโดยใช้สูตร (ประเทือง, 2538)

$$\text{เปอร์เซ็นต์การทำลาย} = \frac{\sum_{i=1}^i 0(n.v)}{iN} \times 100$$

ค่าระดับการทำลาย (value of category) = v

ค่าระดับการทำลายสูงสุด (highest category value) = i

จำนวนต้นพืช (ส่วนของพืช) ในแต่ละระดับ [number of plants (plant parts) in each category] = n

จำนวนพืชทั้งหมดที่ประเมิน (total number of investigate plants (plant parts) = N

วางแผนการทดลองแบบ CRD จำนวน 3 ซ้ำ ๆ ละ 15 ต้น

**บันทึกข้อมูล** - เปอร์เซ็นต์การทำลาย



## ผลการทดลอง

### 1. การศึกษาการแยกและการจำแนกเชื้อราสาเหตุโรคที่สำคัญของกล้วยไม้เอื้องแซะหอม

จากการนำชิ้นส่วนของต้นและใบเอื้องแซะหอมที่แสดงอาการของโรคมาเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ พบว่า สามารถแยกและจำแนกเชื้อราได้คือ *Colletotrichum* sp. (ภาพที่ 1), *Alternaria* sp. (ภาพที่ 2), *Fusarium* sp. (ภาพที่ 3), *Pestalotiopsis* sp. (ภาพที่ 4) , *Exserohilum* sp. (ภาพที่ 5), *Curvularia* sp. (ภาพที่ 6) และเชื้อรา *Nigrospora* sp. (ภาพที่ 7) (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ชื่อและจำนวนเชื้อราที่สามารถแยกและจำแนกชื่อได้จากชิ้นส่วนของต้นเอื้องแซะหอมที่เป็นโรค


| ชื่อเชื้อรา               | จำนวนไอโซเลต |
|---------------------------|--------------|
| <i>Colletotrichum</i> sp. | 4            |
| <i>Alternaria</i> sp.     | 4            |
| <i>Fusarium</i> sp.       | 5            |
| <i>Pestalotiopsis</i> sp. | 25           |
| <i>Exserohilum</i> sp.    | 2            |
| <i>Curvularia</i> sp.     | 1            |
| <i>Nigrospora</i> sp.     | 1            |
| รวม                       | 42           |



ภาพที่ 1 ลักษณะของเชื้อรา *Colletotrichum* sp.

A. ลักษณะเส้นใยของเชื้อรา *Colletotrichum* sp. บนอาหารเลี้ยงเชื้ออายุ 14 วัน


B. ลักษณะโคนิเดียของเชื้อรา *Colletotrichum* sp. (ภาพกำลังขยาย 400 เท่า)



ภาพที่ 2 ลักษณะของเชื้อรา *Alternaria* sp.

A. ลักษณะเส้นใยของเชื้อรา *Alternaria* sp. บนอาหารเลี้ยงเชื้ออายุ 14 วัน

B. ลักษณะโคนินเดียของเชื้อรา *Alternaria* sp. (ภาพกำลังขยาย 400 เท่า)




ภาพที่ 3 ลักษณะของเชื้อรา *Fusarium* sp.

A. ลักษณะเส้นใยของเชื้อรา *Fusarium* sp. บนอาหารเลี้ยงเชื้ออายุ 7 วัน


B. ลักษณะโคนินเดียของเชื้อรา *Fusarium* sp. (ภาพกำลังขยาย 400 เท่า)





ภาพที่ 4 ลักษณะของเชื้อรา *Pestalotiopsis* sp.


- A. ลักษณะเส้นใยของเชื้อรา *Pestalotiopsis* sp. บนอาหารเลี้ยงเชื้ออายุ 14 วัน  
 B. ลักษณะโคนิเดียของเชื้อรา *Pestalotiopsis* sp. (ภาพกำลังขยาย 400 เท่า)



ภาพที่ 5 ลักษณะของเชื้อรา *Exserohilum* sp.


- A. ลักษณะเส้นใยของเชื้อรา *Exserohilum* sp. บนอาหารเลี้ยงเชื้ออายุ 14 วัน  
 B. ลักษณะโคนิเดียของเชื้อรา *Exserohilum* sp. (ภาพกำลังขยาย 400 เท่า)





ภาพที่ 6 ลักษณะของเชื้อรา *Curvularia* sp.

- A. ลักษณะเส้นใยของเชื้อรา *Curvularia* sp. บนอาหารเลี้ยงเชื้ออายุ 14 วัน  
 B. ลักษณะโคนิเดียของเชื้อรา *Curvularia* sp. (ภาพกำลังขยาย 400 เท่า)



ภาพที่ 7 ลักษณะของเชื้อรา *Nigrospora* sp.

- A. ลักษณะเส้นใยของเชื้อรา *Nigrospora* sp. บนอาหารเลี้ยงเชื้ออายุ 14 วัน  
 B. ลักษณะโคนิเดียของเชื้อรา *Nigrospora* sp. (ภาพกำลังขยาย 400 เท่า)

## 2. การศึกษาการทดสอบความสามารถในการก่อโรคของเชื้อราสาเหตุโรคของกล้วยไม้ เอื้องแซะหอม

การศึกษาการทดสอบความสามารถในการก่อโรคของเชื้อรา *Colletotrichum* sp.  
เชื้อรา *Alternaria* sp. และเชื้อรา *Fusarium* sp. ให้ผลดังต่อไปนี้คือ

### 2.1 เชื้อรา *Colletotrichum* sp.

จากการศึกษาการทดสอบความสามารถในการก่อโรคของเชื้อรา *Colletotrichum* sp.  
จำนวน 4 ไอโซเลท (ภาพที่ 8) พบว่า เชื้อรา *Colletotrichum* sp. ทุกไอโซเลท เปอร์เซ็นต์  
การเกิดโรคเท่ากับ 0.00 เปอร์เซ็นต์ คือไม่สามารถก่อให้เกิดโรคหรือความรุนแรงของโรคต่อ  
ต้นเอื้องแซะหอมได้

### 2.2 เชื้อรา *Fusarium* sp.

จากการศึกษาการทดสอบความสามารถในการก่อโรคของเชื้อรา *Fusarium* sp.  
จำนวน 5 ไอโซเลท (ภาพที่ 9) พบว่า เชื้อรา *Fusarium* sp. ทุกไอโซเลท ทุกไอโซเลท  
เปอร์เซ็นต์การเกิดโรคเท่ากับ 0.00 เปอร์เซ็นต์ คือไม่สามารถก่อให้เกิดโรคหรือความรุนแรง  
ของโรคต่อต้นเอื้องแซะหอมได้

### 2.3 เชื้อรา *Alternaria* sp.

จากการศึกษาการทดสอบความสามารถในการก่อโรคของเชื้อรา *Alternaria* sp. ต่อ  
ต้นเอื้องแซะหอมจำนวน 4 ไอโซเลท (ภาพที่ 10) พบว่า หลังจากปลูกเชื้อราเป็นเวลา 7 วัน  
กรรมวิธีการทดลองที่ 12 คือปลูกเชื้อรา *Alternaria* sp. ไอโซเลทที่ 3 มีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรค  
สูงสุดเท่ากับ 76.25 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ เมื่อ  
เปรียบเทียบกับกรรมวิธีการทดลองเปรียบเทียบ รองลงมาได้แก่ กรรมวิธีการทดลองที่ 10 คือ  
ปลูกเชื้อรา *Alternaria* sp. ไอโซเลทที่ 1 และกรรมวิธีการทดลองที่ 13 คือปลูกเชื้อรา  
*Alternaria* sp. ไอโซเลทที่ 4 มีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคเท่ากันคือ 31.25 เปอร์เซ็นต์ สำหรับ  
กรรมวิธีการทดลองที่ 11 คือปลูกเชื้อรา *Alternaria* sp. ไอโซเลทที่ 2 จะมีเปอร์เซ็นต์การเกิด  
โรคน้อยที่สุดเท่ากับ 30.00 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 2 )

จากตารางที่ 3 จะพบว่า หลังจากการปลูกเชื้อรา *Alternaria* sp. ไอโซเลทต่าง ๆ กัน  
เป็นเวลา 14 วัน กรรมวิธีการทดลองที่ 12 คือ ปลูกเชื้อรา *Alternaria* sp. ไอโซเลทที่ 3 มี  
เปอร์เซ็นต์การเกิดโรคสูงสุดเท่ากับ 90.00 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ  
ยิ่งทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีการทดลองเปรียบเทียบ รองลงมาได้แก่ กรรมวิธี  
การทดลองที่ 11 คือ ปลูกเชื้อรา *Alternaria* sp. ไอโซเลทที่ 2 มีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคเท่ากับ  
72.50 เปอร์เซ็นต์ สำหรับกรรมวิธีการทดลองที่ 13 คือปลูกเชื้อรา *Alternaria* sp. ไอโซเลทที่ 4

มีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคเท่ากับ 60.00 เปอร์เซ็นต์ และกรรมวิธีการทดลองที่ 10 คือปลูกเชื้อรา *Alternaria* sp. ไชโยเลขที่ 1 จะมีเปอร์เซ็นต์ของการเกิดโรคน้อยที่สุดเท่ากับ 56.25 เปอร์เซ็นต์

ตารางที่ 2 เปอร์เซ็นต์การเกิดโรคหลังจากปลูกเชื้อรา *Alternaria* sp. ไชโยเลขต่าง ๆ ที่ 7 วัน

| กรรมวิธีการทดลองที่ | เปอร์เซ็นต์ของการเกิดโรค |
|---------------------|--------------------------|
| 10                  | 31.25 <sup>b</sup>       |
| 11                  | 30.00 <sup>b</sup>       |
| 12                  | 76.25 <sup>a</sup>       |
| 13                  | 31.25 <sup>b</sup>       |
| 14                  | 0.00 <sup>c</sup>        |

หมายเหตุ : ตัวอักษรไม่เหมือนกันแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % จากการวิเคราะห์ผลทางสถิติโดยวิธี Duncan' s

#### Multiple Range Test

กรรมวิธีการทดลองที่ 10 คือปลูกเชื้อรา *Alternaria* sp. ไชโยเลขที่ 1

กรรมวิธีการทดลองที่ 11 คือปลูกเชื้อรา *Alternaria* sp. ไชโยเลขที่ 2

กรรมวิธีการทดลองที่ 12 คือปลูกเชื้อรา *Alternaria* sp. ไชโยเลขที่ 3

กรรมวิธีการทดลองที่ 13 คือปลูกเชื้อรา *Alternaria* sp. ไชโยเลขที่ 4

กรรมวิธีการทดลองที่ 14 คือฉีดพ่นน้ำกลั่นหนึ่งฆ่าเชื้อ (กรรมวิธีควบคุม)

ตารางที่ 3 เปอร์เซ็นต์การเกิดโรคหลังจากปลูกเชื้อรา *Alternaria* sp. ไชโยเลขต่าง ๆ ที่ 14 วัน

| กรรมวิธีการทดลองที่ | เปอร์เซ็นต์ของการเกิดโรค |
|---------------------|--------------------------|
| 10                  | 56.25 <sup>c</sup>       |
| 11                  | 72.50 <sup>b</sup>       |
| 12                  | 90.00 <sup>a</sup>       |
| 13                  | 60.00 <sup>c</sup>       |
| 14                  | 0.00 <sup>d</sup>        |

หมายเหตุ : ตัวอักษรไม่เหมือนกันแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % จากการวิเคราะห์ผลทางสถิติโดยวิธี Duncan' s Multiple Range Test

กรรมวิธีการทดลองที่ 10 คือปลูกเชื้อรา *Alternaria* sp. ไชโยเลขที่ 1  
 กรรมวิธีการทดลองที่ 11 คือปลูกเชื้อรา *Alternaria* sp. ไชโยเลขที่ 2  
 กรรมวิธีการทดลองที่ 12 คือปลูกเชื้อรา *Alternaria* sp. ไชโยเลขที่ 3  
 กรรมวิธีการทดลองที่ 13 คือปลูกเชื้อรา *Alternaria* sp. ไชโยเลขที่ 4  
 กรรมวิธีการทดลองที่ 14 คือฉีดพ่นน้ำกลั่นหนึ่งฆ่าเชื้อ (กรรมวิธีควบคุม)

เมื่อแยกเชื้อกลับ (reisolation) และจำแนกเชื้อราที่สามารถแยกได้ทำภายใต้กล้องจุลทรรศน์ พบว่า กรรมวิธีการทดลองที่ 12 คือปลูกเชื้อรา *Alternaria* sp. ไชโยเลขที่ 3 สามารถแยกเชื้อรา *Alternaria* sp. กลับได้จำนวน 7 ไชโยเลข (ตารางที่ 6) รองลงมาได้แก่ กรรมวิธีการทดลองที่ 10 คือปลูกเชื้อรา *Alternaria* sp. ไชโยเลขที่ 1 แยกเชื้อรา *Alternaria* sp. กลับได้จำนวน 3 ไชโยเลข (ตารางที่ 4) กรรมวิธีการทดลองที่ 11 คือปลูกเชื้อรา *Alternaria* sp. ไชโยเลขที่ 2 แยกเชื้อรา *Alternaria* sp. กลับได้จำนวน 2 ไชโยเลข (ตารางที่ 5) และกรรมวิธีการทดลองที่ 13 คือปลูกเชื้อรา *Alternaria* sp. ไชโยเลขที่ 4 ไม่สามารถแยกเชื้อรา *Alternaria* sp. กลับได้ (ตารางที่ 7)

ตารางที่ 4 การแยกเชื้อกลับจากใบเอื้องแซะที่ปลูกเชื้อราจากกรรมวิธีการทดลองที่ 10 คือ ปลูกเชื้อรา *Alternaria* sp. ไอโซเลทที่ 1

| ไม่ทำแผลที่ใบและปลูกเชื้อรา |                  | ทำแผลที่ใบก่อนปลูกเชื้อรา |                       |
|-----------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|
| ไอโซเลทที่                  | เชื้อราที่แยกได้ | ไอโซเลทที่                | เชื้อราที่แยกได้      |
| 1                           | Unknown          | 1                         | Unknown               |
| 2                           | Unknown          | 2                         | <i>Alternaria</i> sp. |
|                             |                  | 3                         | <i>Alternaria</i> sp. |
|                             |                  | 4                         | Unknown               |
|                             |                  | 5                         | <i>Alternaria</i> sp. |
|                             |                  | 6                         | Unknown               |
|                             |                  | 7                         | Unknown               |
|                             |                  | 8                         | Unknown               |

Unknown : ไม่สามารถจำแนกชื่อเชื้อราได้

ตารางที่ 5 การแยกเชื้อกลับจากใบเอื้องแซะที่ปลูกเชื้อราจากกรรมวิธีการทดลองที่ 11 คือ ปลูกเชื้อรา *Alternaria* sp. ไอโซเลทที่ 2

| ไม่ทำแผลที่ใบและปลูกเชื้อรา |                  | ทำแผลที่ใบก่อนปลูกเชื้อรา |                       |
|-----------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|
| ไอโซเลทที่                  | เชื้อราที่แยกได้ | ไอโซเลทที่                | เชื้อราที่แยกได้      |
| 1                           | Unknown          | 1                         | Unknown               |
| 2                           | Unknown          | 2                         | Unknown               |
| 3                           | Unknown          | 3                         | <i>Alternaria</i> sp. |
| 4                           | Unknown          | 4                         | Unknown               |
|                             |                  | 5                         | <i>Alternaria</i> sp. |
|                             |                  | 6                         | Unknown               |
|                             |                  | 7                         | Unknown               |
|                             |                  | 8                         | Unknown               |

Unknown : ไม่สามารถจำแนกชื่อเชื้อราได้

ตารางที่ 6 การแยกเชื้อกลับจากใบเอื้องแซะที่ปลูกเชื้อราจากกรรมวิธีการทดลองที่ 12 คือ  
ปลูกเชื้อรา *Alternaria* sp. ไอโซเลทที่ 3


| ไม่ทำแผลที่ใบและปลูกเชื้อรา |                  | ทำแผลที่ใบก่อนปลูกเชื้อรา |                       |
|-----------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|
| ไอโซเลทที่                  | เชื้อราที่แยกได้ | ไอโซเลทที่                | เชื้อราที่แยกได้      |
| 1                           | Unknown          | 1                         | <i>Alternaria</i> sp. |
| 2                           | Unknown          | 2                         | Unknown               |
|                             |                  | 3                         | <i>Alternaria</i> sp. |
|                             |                  | 4                         | <i>Alternaria</i> sp. |
|                             |                  | 5                         | <i>Alternaria</i> sp. |
|                             |                  | 6                         | <i>Alternaria</i> sp. |
|                             |                  | 7                         | <i>Alternaria</i> sp. |
|                             |                  | 8                         | <i>Alternaria</i> sp. |

Unknown : ไม่สามารถจำแนกชื่อเชื้อราได้

ตารางที่ 7 กรรมวิธีการทดลองที่ 13 ปลูกเชื้อรา *Alternaria* sp. ไอโซเลทที่ 4

| ไม่ทำแผลที่ใบและปลูกเชื้อรา |                  | ทำแผลที่ใบก่อนปลูกเชื้อรา |                  |
|-----------------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| ไอโซเลทที่                  | เชื้อราที่แยกได้ | ไอโซเลทที่                | เชื้อราที่แยกได้ |
| 1                           | Unknown          | 1                         | Unknown          |
| 2                           | Unknown          | 2                         | Unknown          |
| 3                           | Unknown          | 3                         | Unknown          |
| 4                           | Unknown          | 4                         | Unknown          |
| 5                           | Unknown          | 5                         | Unknown          |
|                             |                  | 6                         | Unknown          |
|                             |                  | 7                         | Unknown          |
|                             |                  | 8                         | Unknown          |


Unknown : ไม่สามารถจำแนกชื่อเชื้อราได้



ภาพที่ 8 ลักษณะเส้นใยของเชื้อรา *Colletotrichum* sp. บนอาหารเลี้ยงเชื้อไฮโดรเจลต่าง ๆ กัน

- A : เชื้อรา *Colletotrichum* sp. จากกรรมวิธีการทดลองที่ 1
- B : เชื้อรา *Colletotrichum* sp. จากกรรมวิธีการทดลองที่ 2
- C : เชื้อรา *Colletotrichum* sp. จากกรรมวิธีการทดลองที่ 3
- D : เชื้อรา *Colletotrichum* sp. จากกรรมวิธีการทดลองที่ 4






ภาพที่ 9 ลักษณะเส้นใยของเชื้อรา *Fusarium* sp. บนอาหารเลี้ยงเชื้อไอโซเลทต่าง ๆ กัน

- A : เชื้อรา *Fusarium* sp. จากกรรมวิธีการทดลองที่ 5
- B : เชื้อรา *Fusarium* sp. จากกรรมวิธีการทดลองที่ 6
- C : เชื้อรา *Fusarium* sp. จากกรรมวิธีการทดลองที่ 7
- D : เชื้อรา *Fusarium* sp. จากกรรมวิธีการทดลองที่ 8
- E : เชื้อรา *Fusarium* sp. จากกรรมวิธีการทดลองที่ 9






ภาพที่ 10 ลักษณะเส้นใยของเชื้อรา *Alternaria* sp. บนอาหารเลี้ยงเชื้อไฮโซเลทต่าง ๆ กัน

- A : เชื้อรา *Alternaria* sp. จากกรรมวิธีการทดลองที่ 10
- B : เชื้อรา *Alternaria* sp. จากกรรมวิธีการทดลองที่ 11
- C : เชื้อรา *Alternaria* sp. จากกรรมวิธีการทดลองที่ 12
- D : เชื้อรา *Alternaria* sp. จากกรรมวิธีการทดลองที่ 13

### 3. การศึกษาการประเมินความเสียหายเนื่องจากโรคของกล้วยไม้เอื้องแซะหอม

จากการศึกษาการประเมินความเสียหายเนื่องจากโรคของกล้วยไม้เอื้องแซะหอม โดยการปลูกเชื้อรา *Alternaria* sp. ไอโซเลทที่ 3 ซึ่งสามารถก่อให้เกิดความรุนแรงของโรคมากที่สุด พบว่า เปอร์เซ็นต์การทำลายของเชื้อรา *Alternaria* sp. ไอโซเลทที่ 3 จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ (ภาพที่ 11) โดยพบว่าหลังจากการปลูกเชื้อราเป็นเวลา 1 วัน เปอร์เซ็นต์การทำลายเท่ากับ 21.67 เปอร์เซ็นต์ ที่ 2 วัน เปอร์เซ็นต์การทำลายเท่ากับ 37.22 เปอร์เซ็นต์ ที่ 3 วัน เปอร์เซ็นต์การทำลายเท่ากับ 50.00 เปอร์เซ็นต์ ที่ 4 วัน เปอร์เซ็นต์การทำลายเท่ากับ 57.22 เปอร์เซ็นต์ ที่ 5 วัน เปอร์เซ็นต์การทำลายเท่ากับ 60.00 เปอร์เซ็นต์ ที่ 6 วัน เปอร์เซ็นต์การทำลายเท่ากับ 63.33 เปอร์เซ็นต์ และที่ 7 วัน มี เปอร์เซ็นต์การทำลายเท่ากับ 66.11 เปอร์เซ็นต์ (ภาพที่ 12)



ภาพที่ 11 เปอร์เซ็นต์การทำลายหลังจากการปลูกเชื้อรา *Alternaria* sp. ไอโซเลทที่ 3



ภาพที่ 12 ความรุนแรงของเชื้อรา *Alternaria* sp. ไอโซเลทที่ 3 ที่มีผลต่อดันเอื้องแซะหอม

### วิจารณ์ผลการทดลอง

จากการศึกษาการแยกและการจำแนกเชื้อราสาเหตุโรคที่สำคัญของกล้วยไม้เอื้องแซะหอม พบว่า สามารถแยกตัวอย่างของเชื้อราได้ทั้งหมดจำนวน 42 ไอโซเลท ซึ่งสามารถจำแนกเชื้อรา *Pestalotiopsis* sp. ได้มากที่สุดจำนวน 25 ไอโซเลท รองลงมาได้แก่ เชื้อรา *Fusarium* sp., *Colletotrichum* sp., *Alternaria* sp., *Exserohilum* sp., *Curvularia* sp. และเชื้อรา *Nigrospora* sp. ซึ่งแยกได้จำนวน 5, 4, 4, 2, 1 และ 1 ไอโซเลท ตามลำดับ และเมื่อนำเชื้อรา 3 สกุล คือ เชื้อรา *Colletotrichum* sp., *Fusarium* sp. และ *Alternaria* sp. มาทดสอบความสามารถในการก่อโรคกับต้นเอื้องแซะหอม ซึ่งพบว่าเชื้อรา *Colletotrichum* sp. และ *Fusarium* sp. ไม่สามารถก่อความรุนแรงกับต้นเอื้องแซะหอมได้ อาจเนื่องมาจากจำนวนโคนินเดียของเชื้อรามากเกินไปจนทำให้เกิดการแข่งขัน (competition) ระหว่างเชื้อราด้วยกันเองหรือเชื้อราอ่อนแอ (susceptible inoculum) จนไม่สามารถก่อความเสียหายให้กับต้นเอื้องแซะหอมได้ ซึ่งมีเพียงเชื้อรา *Alternaria* sp. เท่านั้นที่สามารถก่อความเสียหายให้กับต้นเอื้องแซะหอมหลังจากการปลูกเชื้อราเป็นเวลา 7 วัน และ 14 วัน ซึ่งพบว่าเชื้อรา *Alternaria* sp. ไอโซเลทที่ 3 มีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคสูงสุดเท่ากับ 90.00 เปอร์เซ็นต์ หลังจากการปลูกเชื้อราเป็นเวลา 14 วัน

จากการศึกษาการประเมินความเสียหายเนื่องจากโรคของกล้วยไม้เอื้องแซะหอมโดยการปลูกเชื้อรา *Alternaria* sp. ไอโซเลทที่ 3 ซึ่งสามารถก่อให้เกิดความรุนแรงของโรคมากที่สุด ซึ่งจะพบว่า เปอร์เซ็นต์การทำลายของโรคจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ หลังการปลูกเชื้อรา และจะมีเปอร์เซ็นต์การทำลายเท่ากับ 66.11 หลังจากปลูกเชื้อ 7 วัน

### สรุปผลการทดลอง

จากการศึกษาการแยกและการจำแนกเชื้อราสาเหตุโรคของกล้วยไม้เอื้องแซะหอม พบว่า สามารถแยกเชื้อราได้ทั้งหมด 42 ไอโซเลท และจำแนกออกเป็น 7 สกุล และเมื่อนำเชื้อรา *Colletotrichum* sp., *Fusarium* sp. และ *Alternaria* sp. รวมทั้งหมด 13 ไอโซเลท มาทดสอบความสามารถในการก่อโรคกับต้นเอื้องแซะหอม พบว่าเชื้อรา *Colletotrichum* sp. และ *Fusarium* sp. ไม่ทำให้ต้นเอื้องแซะหอมเกิดโรคได้ สำหรับเชื้อรา *Alternaria* sp. เมื่อนำมาทดสอบความสามารถในการก่อโรคจะพบว่า เชื้อรา *Alternaria* sp. ไอโซเลทที่ 3 มีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคสูงสุดเท่ากับ 90.00 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีการทดลองเปรียบเทียบ

จากการศึกษาการประเมินความเสียหายเนื่องจากโรคของกล้วยไม้เอื้องแซะหอม พบว่า เปอร์เซ็นต์การทำลายของเชื้อรา *Alternaria* sp. ไอโซเลทที่ 3 จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หลังการปลูกเชื้อรา จะมีเปอร์เซ็นต์การทำลายเท่ากับ 66.11 หลังจากปลูกเชื้อ 7 วัน

## เอกสารอ้างอิง

- กุลขวี กำจายภัย. 2526. โรคและแมลงศัตรูของกล้วยไม้. บริษัทบางกอกฟลาวเวอร์เซนเตอร์ จำกัด กรุงเทพฯ. 114 หน้า.
- ชวาลา บุรณศิริ. 2529. หลักการป้องกันกำจัดโรคพืช. ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 208 หน้า.
- นนทฤทธิ์ โชคถาวร ธานนท์ ธรรมสาณกุล ประพันธ์ ปันพันธุ์ และณภัทรพงษ์ สุวรรณชัย. 2544. ข้อมูลด้านวิชาการฝ่ายวิจัยน้ำหอม โครงการคืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
- ประเทือง สง่างศ์. 2538. โรคพืชวิทยา. ภาควิชาอารักขาพืช คณะผลิตกรรมการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ 764. หน้า.
- สลิล สิทธิสัจธรรม และนฤมล กฤษณชาญดี. 2545. คู่มือกล้วยไม้. สำนักพิมพ์สารคดี กรุงเทพฯ. 248 หน้า.
- สลิล สิทธิสัจธรรม. 2550. กล้วยไม้ป่าเมืองไทย. กรุงเทพฯ : บ้านและสวน. 495 หน้า.
- สืบศักดิ์ สนธิรัตน์. 2540. การจัดการโรคพืช. ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 139 หน้า.
- อนงค์ จันทรศรีกุล. 2520. โรคและศัตรูไม้ประดับ. บริษัทสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด กรุงเทพฯ. 163 หน้า.
- Seidenfaden, G. 1985. Orchid Genera in Thailand XII. *Dendrobium* Sw. Opera Botanica 83: 107-108.



**ตารางภาคผนวกที่ 1** ผลการวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์การเกิดโรคหลังจากปลูกเชื้อรา *Alternaria* sp.  
ไฮโซเลทต่าง ๆ ที่ 7 วัน

| Source    | df    | SS       | MS       | F     | F.01 |
|-----------|-------|----------|----------|-------|------|
| Treatment | 4     | 59437.50 | 14859.37 | 95.50 | **   |
| Error     | 95    | 14781.25 | 155.59   |       |      |
| Total     | 99    | 74218.75 |          |       |      |
| C.V. %    | 36.95 |          |          |       |      |

\*\* = มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

**ตารางภาคผนวกที่ 2** ผลการวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์การเกิดโรคหลังจากปลูกเชื้อรา *Alternaria* sp.  
ไฮโซเลทต่าง ๆ ที่ 14 วัน

| Source    | df    | SS        | MS       | F     | F.01 |
|-----------|-------|-----------|----------|-------|------|
| Treatment | 4     | 91600.00  | 22900.00 | 77.09 | **   |
| Error     | 95    | 28218.75  | 297.03   |       |      |
| Total     | 99    | 119818.75 |          |       |      |
| C.V. %    | 30.91 |           |          |       |      |

\*\* = มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ